

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZV!N JIT

Bezbedna nega pacijenta na neinvazivnoj ventilaciji


KADA OBAVLJATI?

1. Na početku primene NIV-a
2. Kontinuirana procena tokom primene NIV-a
3. Prilikom promene položaja

KAKO OBAVLJATI?


1. STAVLJANJE MASKE

- Postavite masku preko nosa i usta
- Prvo postavite masku bez pričvršćivanja kaiševa da ublažite osećaj stezanja
- Zaštite mesto fiksiranja maske nekom hidro koloidnom oblogom, npr: Suprasorb, da ne dodje do maceracije kože.
- Fiksirajte kaiševe tako da maska tesno prianja




2. POLOŽAJ MASKE / PROPUŠTANJE

- Proverite da nema propuštanja
- Propuštanje znači da NIV nije adekvatan
- Propuštanje na gornjem delu maske nadražuje oči



3. REAKCIJA PACIJENTA

- Proverite saturaciju kiseonika
- Procenite način disanja i frekvencu
- Proverite puls / ritam i krvni pritisak
- Pratite Glasgow koma skalu (GCS)



KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Pad saturacije kiseonika: **pozovite pomoć ako je SpO₂ <88**
2. Povećanje frekvence disanja: **pozovite pomoć ako je frekvencija disanja >35 ili <8**
3. Pad nivoa svesti: **pozovite pomoć ako je GCS <12**
4. Nestabilan krvni pritisak; ritam srca / puls **pozovite pomoć ako je sistolni krvni pritisak <80, puls <55 ili >130**
5. Kod povraćanja postoji rizik od aspiracije: **pozovite pomoć ako pacijent povraća s maskom na licu, ako je klaustrofobičan, ima teskobe.**