


Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIT

Nega pacijenta s endotrahealnim tubusom (ETT)

Balon za navođenje (Pilot balloon) olakšava naduvavanje balončića (cuffa)



15-milimetarski adapter spaja Ambu balon / masku ili spoj tubusa na creva respiratora

Oznake dubine, takođe se nazivaju i oznakama dubine

KADA OBAVLJATI?

1. Sigurnosne provere: na početku svake smene, kao i PRE I POSLE promene položaja
2. Kontinuirano: sprečavanje pomeranja ETT-a
3. Kontinuirano: praćenje saturacije O₂, prisustvo sekreta, alarma na respiratoru


KAKO OBAVLJATI?

1. Sigurnosne provere

- ETT JE FIKSIRAN, tj. Spoj ne sme biti labav
- Zabežite oznake dubine na usnama – ETT se ne bi smeо pomerati dodatno UNUTRA ili NAPOLJE
- Zabeležite veličinu ETT-a
- Izmerite pritisak u kafu ETT-a pomoću endotesta/aneroidni manometar/, radi prevencije oštećenja traheje, bola u grlu, promuklosti.../ vrednosti od 20cm-30 cm H₂O/
- Ambu balon/maska i sukcija su dostupni/ ispravni

Dubina reza ETT-a

Dubina ETT-a vezana / dubina



2. Sprečavanje pomeranja ETT-a

- Čvrsto pridržavajte ETT prilikom SVAKOG okretanja/premeštanja
- Pacijenti mogu izvući ETT, stoga procenite dubinu sedacije / razmislite o merama sputavanja

3. Praćenje

- Smanjenje nivoa SpO₂ može ukazati na sekreciju ili pomeranje ETT-a
- Ublažavanje sedacije povećava rizik da pacijent izvuče ETT
- Alarmi na respiratoru mogu ukazati na sekreciju ili pomeranje ETT-a

KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Promenio se položaj ETT-a (oznake dubine su različite) **ILI** se čuje krklijanje dok pacijent diše **ILI** vokalizacija: **POZOVITE POMOĆ**
2. Pacijent poseže za ETT-om ili grize ETT kad je blaže sediran: **POZOVITE POMOĆ, sprečite pacijenta da dira ETT**
3. Neplanirano uklanjanje ETT-a: **POZOVITE POMOĆ I DAJTE KISEONIK** putem Ambu balona i maske
4. Praćenje: SpO₂ brzo pada, alarm na respiratoru: **POZOVITE POMOĆ**