

Kratki proceduralni priručnik za osoblje IZVAN JIT

Sigurna primena inotropa i vazopresora

KADA OBAVITI PROVERU?

1. Na početku primene inotropa ili vazopresora.
2. Prilikom primopredaje od druge medicinske sestre.
3. Obavljajte kontinuiranu procenu tokom davanja infuzije.

VAŽNE INFORMACIJE ZA MED. SESTRU

Inotropi i vazopresori služe za održavanje krvnog pritiska.

To je npr. Noradrenalin.

1. Infuzija inotropa/vazopresora **NE SME SE NIKADA:**

- dati u bolusu: to izaziva opasno povećanje krvnog pritiska i pulsa
- dopustiti da istekne: to izaziva brz pad krvnog pritiska
- prekinuti ili pauzirati (osim ako to ne učini tim iz JIT)

2. Pristup

- **OBAVEZNO** primeniti putem centralnog venskog katetera prikladnog lumena
- Infuzija inotropa/vazopresora mora biti jasno obeležena

3. Pumpe

- **UVEK** uključite pogon pumpe / injektomata u bolnički izvor energije
- Pripremite zamenski špic za svaku infuziju inotropa/vazopresora da ne istekne
- Po mogućnosti pripremite rezervnu pumpu



4. Praćenje

- **UVEK** kontinuirano pratite EKG i krvni pritisak



KLJUČNI SIGURNOSNI PROBLEMI / KADA POZVATI POMOĆ

1. Nestabilan krvni pritisak: **Zvati pomoć ako je sistolni pritisak <80mmHg**
2. Nestabilan puls: **Pozvati pomoć ako je puls <55 ili >130**
3. **Pozvati pomoć u slučaju značajnih promena EKG-a**
4. Preostao je 1 sat infuzije ili manje